

# GdB-Tabelle

## Rheumatische Krankheiten sowie Haltungsorgane und Bewegungsorgane

<a href="#">Entzündlich-rheumatische Krankheiten der Gelenke bzw. der Wirbelsäule</a>	
Erkrankung	GdB Wert
ohne Funktionseinschränkungen oder mit geringen Beschwerden	10
bei leichten Auswirkungen und Funktionseinbußen	20-40
bei andauernden mittelgradigen Beschwerden	50-70
bei schweren irreversiblen Auswirkungen	80-100

Beschwerden, die trotz Therapie länger als 6 Monate andauern, werden gesondert Berücksichtigt.

<a href="#">Chronische Osteomyelitis</a>	
Erkrankung	GdB Wert
Inaktive Osteomyelitis (seit mind. 5 Jahren)	0-10
mit geringen Auswirkungen (geringe Fisteleiterung)	mind. 20
mit mittleren Auswirkungen (ständige Fisteleiterung)	mind. 50
mit starken Auswirkungen (starke Fieberschübe und Infiltration der Weichteile)	mind. 70

<a href="#">Muskelkrankheiten / Muskelschwäche</a>	
Erkrankung	GdB Wert
mit leichten Auswirkungen (Schlaffheit, Gestörte Muskelkoordination)	20-40
mit mittleren Auswirkungen (Muskeldeformation, Schwierigkeiten beim Aufrichten)	50-80
mit schweren Auswirkungen (Bewegungsunfähigkeit der Arme und Beine)	90-100

<a href="#">Kleinwuchs</a>	
Erkrankung	GdB Wert
bis 120 cm	60-100

bis 130 cm	50
bis 140 cm	30-40

Bei Kleinwuchs werden Körperproportionen, Gelenkfunktionen, neurologische Störungen, Muskelfunktionen, Sinnesorgane, Statik, endokrine Ausfälle in die Bewertung einberechnet.

<u>Wirbelsäulenschäden</u>	
Erkrankung	GdB Wert
ohne Auswirkungen auf die Stabilität	0
mit geringen Verformungen und Auswirkungen auf die Stabilität. Leichte Bewegungseinschränkungen und Wirbelsäulensyndrome.	10
mit mittleren Auswirkungen auf die Stabilität. Mittelschwere Wirbelsäulensyndrome und Verformungen, welche die Stabilität gefährden.	20
mit schweren funktionellen Auswirkungen auf die Stabilität. Schwere Wirbelsäulensyndrome und Verformungen, welche die Stabilität beeinträchtigen und Bewegungsstörungen bewirken.	30
mit mittleren bis schweren Auswirkungen der Funktionalität in 2 Abschnitten der Wirbelsäule.	30 - 40
mit sehr schweren, bewegungseinschränkenden Auswirkungen wie z.B. schwere Skoliose oder Versteifung.	50 - 70
bei schwersten Bewegungseinschränkungen sowie Unfähigkeit zu gehen oder stehen.	80 - 100

<u>Beckenschäden</u>	
Erkrankung	GdB Wert
ohne Auswirkung auf die Funktionalität	0
mit geringen Auswirkung auf die Funktionalität	10
mit mittleren Auswirkung auf die Funktionalität	20
mit schweren Auswirkung auf die Funktionalität z.B. durch Verformungen	30-40

Verschiedene Beeinträchtigungen durch gynäkologische, neurologische und urologische Ursachen werden gesondert einberechnet.

<u>Endoprothesen</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Einseitige Prothese im Hüftgelenk	20
Beidseitige Prothese im Hüftgelenk	40
Einseitige Prothese im Kniegelenk	30
Beidseitige Prothese im Kniegelenk	50

Andere Endoprothesen in großen Gelenken sind ähnlich den Endoprothesen in

Kniegelenken zu bewerten.

<u>Aseptische Nekrosen</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Hüftkopfnekrose	70
Lunatum-Malazie	30

Fortschreitende Funktionsbeeinträchtigungen verändern den Wert.

<u>Gliedmaßenschäden</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Verlust beider Hände oder Arme	100
Verlust eines Armes und eines Beines	100
Verlust eines Armes im Schultergelenk	80
Verlust eines Armes am Unterarm	50
Verlust einer kompletten Hand	50
Versteifung eines Schultergelenks	30-50
Einschränkung in der Bewegung des Schultergelenks	40
Pseudoarthrose im Schlüsselbein oder Arm	0 - 40
Bewegungseinschränkung / Versteifung des Ellenbogens	0 - 40
Verlust von einem Finger	10
Verlust von zwei Fingern	30
Verlust von drei Fingern	40
Verlust von vier Fingern	50
Verlust von fünf Fingern an einer Hand	50
Verlust von zwei bis fünf Fingern an beiden Händen	80
Verlust aller zehn Finger	100
Verlust beider Beine am Oberschenkel	100
Verlust beider Beine - eins Oberschenkel und eins am Unterschenkel	100
Verlust beider Beine am Unterschenkel	80 - 100
Teilverlust eines Fußes	30 - 70
Versteifung beider Hüftgelenke	100

<u>Vollständige Nervenausfälle</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Armplexus	80
N. radialis und axillaris	50
N. radialis und ulnaris	50
N. radialis und medianus	50
N. ulnaris und medianus	50

## Harnorgane

<u>Nierenschäden</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Ausfall oder Verlust einer Niere, wenn die andere intakt ist	25
Fehlbildung der Niere oder Nephroptose ohne Beschwerden	0 - 10
Fehlbildung der Niere oder Nephroptose mit Beschwerden	20 - 30
Nierensteinleiden ohne Funktionseinschränkung aber mit seltenen Koliken	0 - 10
Nierensteinleiden ohne Funktionseinschränkung aber mit häufigen Koliken	20 - 30
Nephrotisches Syndrom ohne Ödem	20 - 30
Nephrotisches Syndrom mit Ödem	40 - 50
Nierenfunktionseinschränkung mit leichtem Grad	20 - 40
Nierenfunktionseinschränkung mit mittlerem Grad	50 - 70
Nierenfunktionseinschränkung mit schwerem Grad	80 - 100
Ausfall oder Verlust einer Niere, wenn die andere funktionell leicht eingeschränkt ist	
Ausfall oder Verlust einer Niere, wenn die andere funktionell leicht eingeschränkt ist	40 - 50
Ausfall oder Verlust einer Niere, wenn die andere funktionell mittel eingeschränkt ist	60 - 80
Ausfall oder Verlust einer Niere, wenn die andere funktionell schwer eingeschränkt ist	90 - 100

<u>Nierentumore und Nierenkrebs</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Nierenschäden mit Funktionseinschränkungen nach Entfernung eines Nierenbeckentumors oder Nierentumors im Stadium M0/N0/T1	50
Nierenschäden mit Funktionseinschränkungen nach Entfernung eines Nierenbeckentumors oder Nierentumors im Stadium M0/N0/T2 oder höher	60 - 100
Nierenschäden mit Funktionseinschränkungen nach Entfernung eines Nephroblastoms	60 - 100

<u>Harnwegsprobleme und Harnwegsentzündungen</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Chronische Entzündungen der Harnwege leichten Grades	0 - 10
Chronische Entzündungen der Harnwege mittleren Grades	20 - 40
Chronische Entzündungen der Harnwege schweren Grades	50 - 70
Entleerungsstörungen der Blase leichten Grades	10

Entleerungsstörungen der Blase mittleren Grades (z.B. Restharnbildung oder Schmerzen beim Entleeren)	20 - 40
Entleerungsstörungen der Blase schweren Grades (z.B. notwendiger dauerhafter Kathetereinsatz)	50
Nach Entfernung eines Blasen Tumors (Je nach Entwicklung)	50 - 100
Blasenentfernung inkl. künstliche Harnableitung	80
Leichte Harninkontinenz (Grad 1-3)	0 - 40
Vollständige Harninkontinenz	50
Vollständige Harninkontinenz bei schlechter Versorgungsmöglichkeit	60
Harnweg-Darmfistel mit Stuhlinkontinenz	30 - 50
Künstliche Harnableitung in den Darm	30
Künstliche Harnableitung nach Außen	50 - 80
Darmneoblase	30

<u>Männliche Geschlechtsorgane</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Teilverlust des Penis	40
Komplettverlust des Penis	50
Nur ein intakter Hoden	0
Verlust, Schwund oder Unterentwicklung beider Hoden	0 - 40
Varikozele (Krampaderbruch)	0 - 10
Hydrozele (Wasserbruch)	0 - 10
Chronische bakterielle Entzündung der Prostata ohne Miktionsstörung	0 - 10
Chronische bakterielle Entzündung der Prostata mit andauernden Störungen oder Schmerzen	20

<u>Weibliche Geschlechtsorgane</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Einseitige Mastektomie (Verlust der Brust)	30
Beidseitige Mastektomie (Verlust der Brust)	40
Quadranten- oder Segmentresektion der Brust	0 - 20
Nach Entfernung eines Brusttumors / Brustkrebs je nach Stadium	50 - 80
Sterilität oder Verlust der Gebärmutter	0 - 20
Nach Entfernung eines Zervixtumors je nach Stadium	50 - 80
Unterentwickelte Eierstöcke oder Verlust der Eierstöcke	0 - 40
Leichte Endometriose	0 - 10
Mittlere Endometriose	20 - 40
Schwere Endometriose	50 - 60

Harnweg-Scheidenfisteln	50 - 60
Mastdarm-Scheidenfistel	60 - 70
Kloakenbildung durch Harnweg-Mastdarm-Scheidenfistel	100
Geringe Harninkontinenz	0 - 10
Mittlere Harninkontinenz	20 - 40
Starke Harninkontinenz	50 - 60
Scheiden-Gebärmutteraplasie	40
Leichte Kraurosis vulvae	0 - 10
Mittlere Kraurosis vulvae	20 - 30
Schwere Kraurosis vulvae	40
Komplette Entfernung der Vulva	40

## Gesicht und Kopf

<a href="#">Gesicht und Kopf</a>	
Erkrankung	GdB Wert
Einfache Schädelbrüche ohne Komplikationen	0
Geringe Knochenlücken in der Schädelsubstanz	0 - 10
Schädelnarben am Hirnschädel mit beträchtlichem Verlust der Knochenmasse	30
Geringe Gesichtsentstellung	10
Mittlere Gesichtsentstellung	20 - 30
Erhebliche Gesichtsentstellung	50
Leichte Sensibilitätsstörungen im Gesicht	10
Starke Sensibilitätsstörungen im Gesicht	20 - 30
Leichte Gesicht neuralgien	0 - 10
Mittlere Gesicht neuralgien	20 - 40
Schwere Gesicht neuralgien	50 - 60
Sehr schwere Gesicht neuralgien	70 - 80
Echte Migräne mit leichten Verläufen	0 - 10
Echte Migräne mit mittelschweren Verläufen	20 - 40
Echte Migräne mit schweren Verläufen	50 - 60
Einseitige Periphere Fazialisparese mit geringer störender Restparese	0 - 10
Einseitige Periphere Fazialisparese mit starker Restparese oder Kontrakturen	20 - 30
Einseitige Periphere Fazialisparese mit kompletter Lähmung	40
Beidseitige Periphere Fazialisparese mit kompletter Lähmung	50

## Haut

<a href="#">Haut</a>
----------------------

<b>Erkrankung</b>	<b>GdB Wert</b>
Kontaktekzem mit geringer Ausdehnung und selten auftretend	0 - 10
Sonstige Kontaktekzeme	20 - 30
Gerines atopisches Ekzem (begrenzt)	0 - 10
Länger andauerndes atopisches Ekzem	20 - 30
Atopisches Ekzem mit generalisierten Hauterscheinungen	40
Atopisches Ekzem mit mehrmaliger intensiver ambulanter Behandlungsnotwendigkeit im Jahr	50
Geringes seborrhoisches Ekzem	0 - 10
Sonstiges seborrhoisches Ekzem (je nach Ausdehnung)	20 - 30
Selten auftretende Urtikaria (Chronisch rezidivierend)	0 - 10
Häufig auftretende Urtikaria (Chronisch rezidivierend)	20 - 30
Schwere chronisch rezidivierende Urtikaria	40 - 50
Leichte bis mittlere Akne vulgaris	0 - 10
Schwere bis mittlere Akne vulgaris	20 - 30
Leichte bis mittlere Akne conglobata	30 - 40
Schwere bis mittlere Akne conglobata	mind. 50
Gering ausgedehnte Rosazea	0 - 10
Stark ausgedehnte Rosazea	20 - 30
Geringe Psoriasis vulgaris	0 - 10
Mittlere Psoriasis vulgaris	20
Starke Psoriasis vulgaris	30 - 50
Leichte Erythrodermie	40
Mittlere Erythrodermie	50 - 60
Schwere Erythrodermie	70 - 80
Leichte Ichthyosis	0 - 10
Mittlere Ichthyosis	20 - 40
Schwere Ichthyosis	50 - 80
Begrenzte Mykose	0 - 10
Mykose mit Befall der Finger	20
Chronisch rezidivierendes Erysipel ohne bleibendes Lymphödem	10
Sonstige chronisch rezidivierende Erysipel (abhängig von der Ausprägung des Lymphödems)	20 - 40
Selten auftretender, chronisch rezidivierender Herpes simplex mit geringer Ausdehnung	0 - 10
Häufiger auftretender, chronisch rezidivierender Herpes simplex mit größerer Ausdehnung	20
Kompletter Haarausfall (betrifft auch Wimpern und Augenbrauen)	30
Geringe Pigmentstörungen im Gesicht oder an den Händen	10
Großflächige Pigmentstörungen im Gesicht oder an den Händen	20

Entwicklung von Hautkrebs / eines Hauttumors des Stadiums pT1-2, pN0-2 oder M0	50
Entwicklung von Hautkrebs / eines Hauttumors in anderen Stadien	80

## Nervensystem und Psyche

<u>Nervensystem und Psyche</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Hirnschäden mit geringer Leistungsbeeinträchtigung	30 - 40
Hirnschäden mit mittlerer Leistungsbeeinträchtigung	50 - 60
Hirnschäden mit starker Leistungsbeeinträchtigung	70 - 100
Hirnschäden mit leichten psychischen Störungen	30 - 40
Hirnschäden mit mittleren psychischen Störungen	50 - 60
Hirnschäden mit schweren psychischen Störungen	70 - 100
Leichte Hirnschäden mit zentral vegetativen Störungen (z.B. Schlafstörungen)	30
Mittlere Hirnschäden mit zentral vegetativen Störungen (ggf. mit Synkopalen Anfällen)	40
Schwere Hirnschäden mit zentral vegetativen Störungen (häufige Anfälle)	50
Koordinationsstörungen oder Gleichgewichtsstörungen beim Gehen und Stehen (zerebrale Ursache)	30 - 100
Leichte Kognitive Leistungsstörungen durch Hirnschäden (z.B. Restaphasie)	30 - 40
Mittlere Kognitive Leistungsstörungen durch Hirnschäden (z.B. Apraxie, Aphasie oder Agnosie)	50 - 80
Schwere Kognitive Leistungsstörungen durch Hirnschäden (z.B. globale Aphasie)	90 - 100
Leichte Restlähmungen / Tonusstörungen der Gliedmaßen (Zerebrale Ursachen)	30
Hemiplegie (Komplette Lähmung von Arm und Bein)	100
Einseitiges oder beidseitiges Parkinson-Syndrom mit geringen Störungen	30 - 40
Einseitiges oder beidseitiges Parkinson-Syndrom mit deutlichen Störungen	50 - 70
Einseitiges oder beidseitiges Parkinson-Syndrom mit schweren Störungen (auch Immobilität)	80 - 100
Epileptische Anfälle die sehr selten auftreten und lange Pausen haben (mehrere Monate)	40
Epileptische Anfälle die selten auftreten und mehrwöchige Pausen haben	50 - 60
Epileptische Anfälle welche mit mittlerer Häufigkeit auftreten und mehrtägige Pausen haben	60 - 80

Epileptische Anfälle die oft (bis zu täglich) auftreten	90 - 100
Leichte Entwicklungsstörungen in der Motorik, Sprache oder Aufmerksamkeit ohne Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung	10
Entwicklungsstörungen in der Motorik, Sprache oder Aufmerksamkeit je nach Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung	20 - 50
Globale Entwicklungsstörungen in den Bereichen Kommunikation, Motorik, Spielverhalten, soziale Interaktion, Selbstständigkeit	30 - 100
Leichte Legasthenie / isolierte Rechenstörung (Kognitive Teilleistungsschwächen) - Schulleistung wird kaum beeinträchtigt	0 - 10
Mittlere Legasthenie / isolierte Rechenstörung (Kognitive Teilleistungsschwächen) mit Konzentrationsstörungen	20 - 40
Schwere Legasthenie / isolierte Rechenstörung (Kognitive Teilleistungsschwächen) mit starken Auswirkungen	50
Intelligenzrückstand oder eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit mit geringen Auswirkungen	30 - 40
Intelligenzrückstand oder eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit mit mittleren Auswirkungen	50 - 70
Intelligenzrückstand oder eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit mit starken Auswirkungen	80 - 90
Intelligenzrückstand oder eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit mit sehr starken Auswirkungen	100
Leichtes Autistisches Syndrom	50 - 80
Leichtes Autistisches Syndrom	100
Weitere psychosoziale und emotionale Störungen mit erheblicher Dauer	50 - 80
Mehr als ein halbes Jahr andauernde Psychose im floriden Stadium	50 - 100
Schizophrener Residualzustand mit einzelnen und geringen Restsymptomen	0
Schizophrener Residualzustand ohne soziale Anpassungsstörungen	20
Schizophrener Residualzustand mit leichten soziale Anpassungsstörungen	30 - 40
Schizophrener Residualzustand mit mittelschweren soziale Anpassungsstörungen	50 - 70
Schizophrener Residualzustand mit schweren soziale Anpassungsstörungen	80 - 100
Affektive Psychose mit bis zu 2 Phasen im Jahr (mehrwöchige Dauer)	30 - 50
Affektive Psychose mit häufigen mehrwöchigen Phasen	60 - 100
Affektive Psychose mit vorangegangenen depressiven Phasen	50

Sonstige Affektive Psychosen	30
Leichte psychische Störungen	0 - 20
Mittlere psychische Störungen (Z.B. Depressionen oder phobische Störungen)	30 - 40
Starke psychische Störungen (Z.B. starke Zwangsstörungen)	50 - 100

<a href="#">Rückenmarksschäden</a>	
Erkrankung	GdB Wert
Leichte unvollständige Halsmarkschädigungen (Auswirkungen auf beide Seiten). Keine Störung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion.	30 - 60
Unvollständige Brustmarkschädigungen oder Lendenmarkschädigung (Teillähmung beider Beine). Keine Störung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion.	30 - 60
Unvollständige Brustmarkschädigungen oder Lendenmarkschädigung (Teillähmung beider Beine) und Störung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion.	60 - 80
Unvollständige bis vollständige Halsmarkschädigung oder Brustmarkschädigung mit Lähmungen von Armen und Beinen sowie Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion.	100

## Immunsystem, Blut, blutbildende Organe

<a href="#">Immunsystem, Blut, blutbildende Organe</a>	
Erkrankung	GdB Wert
Verlust der Milz vor dem 8. Lebensjahr	20
Verlust der Milz nach dem 8. Lebensjahr	10
Hodgkin-Krankheit im Stadium 1 - 3a	50 - 100
Hodgkin-Krankheit im Stadium 3b - 4	60 - 100
Non-Hodgkin-Lymphome (z.B. Chronische lymphatische Leukämie) ohne konkrete Beschwerden - kein Behandlungsbedarf	30 - 40
Non-Hodgkin-Lymphome (z.B. Chronische lymphatische Leukämie) mit teilweise Beschwerden - Behandlungsbedarf	50 - 70
Non-Hodgkin-Lymphome (z.B. Chronische lymphatische Leukämie) mit starken Beschwerden	80 - 100
Hochmaligne Non-Hodgkin-Lymphome bis Ende der Intensiv-Therapie	100
Hochmaligne Non-Hodgkin-Lymphome wonach eine dreijährige Vollremission nötig ist	80

Myelom (Plasmozytom) mit geringen Beschwerden - kein Behandlungsbedarf	30 - 40
Myelom (Plasmozytom) mit mittleren Beschwerden - Behandlungsbedarf	50 - 70
Myelom (Plasmozytom) mit starken Beschwerden	80 - 100
Myeloische Leukämie in der chronischen Phase	50 - 80
Myeloische Leukämie in der akuten Phase	100
Weitere leichte chronische myeloproliferative Erkrankungen (z. B. Essenzielle Thrombozythämie, Polycythaemia vera)	20
Weitere mittlere chronische myeloproliferative Erkrankungen (z. B. Osteomyelosklerose)	30 - 40
Weitere schwere chronische myeloproliferative Erkrankungen (z. B. mäßige Anämie)	50 - 70
Weitere sehr schwere chronische myeloproliferative Erkrankungen (z. B. starke Milzvergrößerung)	80 - 100
Akute Leukämie bis Ende der Intensiv-Therapie	100
Akute Leukämie wonach eine dreijährige Vollremission nötig ist	60
Myelodysplastisches Syndrom mit schwachen Auswirkungen	20
Myelodysplastisches Syndrom mit gemäßigten Auswirkungen (z.B. gelegentliche Transfusionen)	30 - 40
Myelodysplastisches Syndrom mit schweren Auswirkungen (z.B. rezidivierende Infektionen)	50 - 80
Myelodysplastisches Syndrom mit sehr schweren Auswirkungen (z.B. leukämische Infektionen)	100
Knochenmarktransplantation mit Heilungsbewährung von 3 Jahren	100
Anämie mit geringen Auswirkungen (keine speziellen Störungen)	0 - 10
Anämie mit mittleren Auswirkungen (gelegentliche Transfusionen)	20 - 40
Anämie mit starken Auswirkungen (andauernde Transfusionen)	50 - 70
Leichte Plasmatische Blutkrankheiten und Hämophilie	20
Mittlere Plasmatische Blutkrankheiten und Hämophilie (zeitweise und dauerhafte Blutungen)	30 - 80
Schwere Plasmatische Blutkrankheiten und Hämophilie (AHG mit weniger als 1%)	80 - 100
Weitere Blutungsleiden ohne Auswirkungen	10
Weitere Blutungsleiden mit mittleren Auswirkungen	20 - 40
Weitere Blutungsleiden mit schweren Auswirkungen	50 - 70
Weitere Blutungsleiden mit ständiger klinisch manifester Blutungsneigung (lebensbedrohliche Blutungen)	80 - 100

Immundefekte ohne klinische Symptomatik	0
Immundefekte mit erhöhter Infektanfälligkeit	20 - 50
HIV-Infektion ohne klinische Symptomatik	10
HIV-Infektion mit geringer Leistungsbeeinträchtigung (Lymphadenopathiesyndrom - LAS)	30 - 40
HIV-Infektion mit mittlerer Leistungsbeeinträchtigung (AIDS related Complex - ARC)	50 - 80
HIV-Infektion mit schwerer Leistungsbeeinträchtigung (AIDS Vollbild)	100

## Sehorgan (Augen)

<u>Sehorgan (Augen)</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Linsenverlust eines Auges mit korrigierter Kunstlinse oder Kontaktlinse - Sehschärfe 0,4 und mehr	10
Linsenverlust eines Auges mit korrigierter Kunstlinse oder Kontaktlinse - Sehschärfe 0,1 bis 0,39	20
Linsenverlust eines Auges mit korrigierter Kunstlinse oder Kontaktlinse - Sehschärfe unter 0,1	25 - 30
Strabismus (Augenmuskellähmung) wenn ein Auge wegen der Doppelbilder vom Sehen ausgeschlossen werden muss	30
Strabismus (Augenmuskellähmung) bei einseitiger Bildunterdrückung	10
Vollständigen Verschluss des Auges (nicht korrigierbar) durch Lähmung des Oberlides	30
Sonstige Augenmuskellähmung	20
Einseitige Fehlstellungen der Lider	0 - 10
Beidseitige Fehlstellungen der Lider	20
Gesichtsfeldausfälle Homonyme Hemianopsie	40
Gesichtsfeldausfälle Bitemporale Hemianopsie	30
Gesichtsfeldausfälle Binasale Hemianopsie mit beidäugigem Sehen	10
Gesichtsfeldausfälle Binasale Hemianopsie mit Verlust des beidäugigem Sehens	30
Gesichtsfeldausfälle Homonymer Quadrant oben	20
Gesichtsfeldausfälle Homonymer Quadrant unten	30
Kompletter Ausfall beider unterer Hälften des Gesichtsfeldes	60
Nasaler Ausfall einer Gesichtsfeldhälfte bei Verlust oder Blindheit des anderen Auges	60

Temporärer Ausfall einer Gesichtsfeldhälfte bei Verlust oder Blindheit des anderen Auges	70
Gesichtsfeldeinengungen mit allseitigen Einengungen je nach Grad	10 - 100
Unregelmäßige Gesichtsfeldausfälle mit mindestens 1/3 ausgefallene Fläche	20
Unregelmäßige Gesichtsfeldausfälle mit mindestens 2/3 ausgefallene Fläche	50
Nach Entfernung eines Augentumors in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung bei Tumorbegrenzung auf den Augapfel (auch Entfernung des Augapfels)	50
Nach Entfernung eines Augentumors in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung mit sonstigen Asuwirkungen	80 - 100

## Obere Luftwege, Mundhöhle und Rachenraum sowie Lunge und Brustkorb

<a href="#">Obere Luftwege, Mundhöhle und Rachenraum</a>	
Erkrankung	GdB Wert
Defekte Lippen mit andauerndem Speichelfluss	20 - 30
Frey-Syndrom (Speichelfistel Außen) mit geringer Sekretion	10
Sonstiges Frey-Syndrom (Speichelfistel Außen)	20
Gestörte Speichelsekretion (Trockenheit im Mund oder vermehrter Speichelfluss)	0 - 20
Schwere Funktionsstörung der Zunge auf Grund einer Lähmung oder Gewebsverlust	30 - 50
Behinderung der Mundöffnung mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme	20 - 40
Kieferklemme mit Auswirkungen auf Ernährung oder Sprache	50
Teilverlust des Unterkiefers mit Pseudoarthrose - keine Beeinträchtigung beim kauen oder sprechen	0 - 10
Teilverlust des Unterkiefers mit Pseudoarthrose - schwere Beeinträchtigung beim kauen oder sprechen	20 - 50
Teilverlust des Oberkiefers - keine Beeinträchtigung beim kauen oder sprechen	0 - 10
Teilverlust des Oberkiefers - schwere Beeinträchtigung beim kauen oder spreche	20 - 40
Umfassender Verlust der Zähne - mehr als ein halbes Jahr prothetisch nur unzureichend zu versorgen	20

Erheblicher Teilverlust des Alveolarfortsatzes mit nicht voll ausgleichbarer Funktionsbehinderung	20
Gaumendefekt mit Defektprothese	30
Gaumenverlust ohne mögliche Korrektur durch eine Prothese	50
Voll ausgebildete Lippenspalte (Voll isoliert) - je nach Ausprägung	30 - 50
Lippen-Kieferspalte bis Ende der Erstbehandlung	60 - 70
Lippen-Kieferspalte bis Verschuß der Spalte	50
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte mit Hörstörung und Störung der Nasenatmung	100
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte bis Verschuß der Spalte	50
Totale Gaumenspalte und Segelspalte (ohne Kieferspalte) bis Ende der Erstbehandlung	100
Submuköse Gaumenspalte oder Isolierte Segelspalte - bis zum Ende der Behandlung	0 - 30
Schluckstörungen (Dysphagie) ohne Beeinträchtigung der Nahrungsaufnahme	0 - 10
Schluckstörungen (Dysphagie) mit starker Beeinträchtigung der Nahrungsaufnahme	20 - 40
Schluckstörungen (Dysphagie) mit starken Auswirkungen auf den Ernährungszustand und häufiger Aspiration	50 - 70
Teilweise Verlust des Kehlkopfes je nach Auswirkungen auf das Sprechverhalten und den körperlichen Zustand	20 - 50
Teilweise Verlust des Kehlkopfes nach Entfernung einer Geschwulst im Frühstadium (T1 N0 M0)	50 - 60
Sonstiger teilweiser Verlust des Kehlkopfes	80
Verlust des gesamten Kehlkopfes mit guter Ersatzstimme und ohne Begleiterscheinungen	70
Verlust des gesamten Kehlkopfes in anderen Fällen	80
Verlust des gesamten Kehlkopfes auf Grund eines Tumors mit einer 5 jährigen Heilungsbewährung	100
Tracheostoma (reizlos) - z.B. Tracheitis oder Bronchitis	50 - 80
Tracheostoma mit starken Reizerscheinungen	50 - 80
Organische und funktionelle Stimmstörung mit geringer belastungsabhängiger Heiserkeit	0 - 10
Organische und funktionelle Stimmstörung mit anhaltender Heiserkeit	20 - 30
Organische und funktionelle Stimmstörung mit Flüsterstimme oder Stimmlosigkeit	40 - 50
Sprachstörungen durch Lähmungen oder Veränderungen im Rachen oder der Mundhöhle - Verständliche Sprache	10

Sprachstörungen durch Lähmungen oder Veränderungen im Rachen oder der Mundhöhle - Schwer verständliche Sprache	20 - 40
Sprachstörungen durch Lähmungen oder Veränderungen im Rachen oder der Mundhöhle - Kaum verständliche Sprache	50
Leichtes Stottern	0 - 10
Mittelschweres Stottern	20
Schweres Stottern	30 - 40
Schweres Stottern mit kaum verständlicher Sprache	50

<u>Lunge und Brustkorb</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Defekte Knochen und Brüche beim Schlüsselbein, Rippen oder Brustbein	0 - 10
Defekte an den Rippen mit Brustfellschwarten - keine Funktionsstörung	0 - 10
Starke Defekte an den Rippen mit Brustfellschwarten - mit Entstellungen	20
Brustfellschwarten oder Brustfellverwachsungen ohne Störungen	0 - 10
Leichte chronische Bronchiektasen oder Bronchitis - kaum Auswurf oder Husten	0 - 10
Starke chronische Bronchiektasen oder Bronchitis - starker Husten und Auswurf	20 - 30
Pneumokoniosen (z. B. Asbestose, Silikose) ohne Auswirkungen	0 - 10
Geringfügige Erkrankung der Atmungsorgane mit Atemnot bei mittlerer Belastung	20 - 40
Mittelstarke Erkrankung der Atmungsorgane mit Atemnot bei leichter Belastung	50 - 70
Starke Erkrankung der Atmungsorgane mit Atemnot bei geringster Belastung	80 - 100
Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines Lungentumors oder Bronchialtumors	mindestens 80
Mittlere bis schwere Einschränkung der Lungenfunktion nach Entfernung eines Lungentumors oder Bronchialtumors	90 - 100
Seltenes Bronchialasthma mit leichten Anfällen	0 - 20
Häufiges Bronchialasthma mit schweren Anfällen	30 - 40
Bronchialasthma Serien mit schweren Anfällen	50
Leichtes Bronchialasthma bei Kindern	20 - 40
Mittleres Bronchialasthma bei Kindern	50 - 70
Starkes Bronchialasthma bei Kindern	80 - 100
Gemischtförmiges oder Obstruktives Schlaf-Apnoe-Syndrom ohne nötige nasale Überdruckbeatmung	0 - 10
Gemischtförmiges oder Obstruktives Schlaf-Apnoe-Syndrom mit nötiger nasale Überdruckbeatmung	20

Gemischtförmiges oder Obstruktives Schlaf-Apnoe-Syndrom bei nicht durchführbarer nasale Überdruckbeatmung	mind. 50
Ansteckende Lungentuberkulose	100

## Gleichgewichtsorgane und Hörorgane

<a href="#">Gleichgewichtsorgane und Hörorgane</a>	
Erkrankung	GdB Wert
Taubheit - Angeboren oder bis zum 7. Lebensjahr erworben - Wahrscheinlich lebenslang	100
Taubheit mit Sprachstörungen- Vom 8. bis 18. Lebensjahr erworben - Wahrscheinlich lebenslang	100
Leichte Gleichgewichtsstörungen mit geringer Unsicherheit und Schwindelgefühlen	0 - 20
Mittlere Gleichgewichtsstörungen mit größerer Unsicherheit und einer Fallneigung	30 - 40
Schwere Gleichgewichtsstörungen mit starkem Schwindel und Gehschwierigkeiten / Stehschwierigkeiten	50 - 70
Gleichgewichtsstörungen mit Unfähigkeit zu gehen oder stehen	80
Tinnitus (Ohrgeräusche) ohne psychische Begleiterscheinungen	0 - 10
Tinnitus (Ohrgeräusche) mit starken psychovegetativen Begleiterscheinungen	20
Tinnitus (Ohrgeräusche) mit starken Einschränkungen (z.B. Depressionen)	30 - 40
Tinnitus (Ohrgeräusche) mit starken psychischen Störungen	mindestens 50
Mittelohrentzündung (chronisch) - Einseitig andauernde Sekretion	10
Mittelohrentzündung (chronisch) - Beidseitig andauernde Sekretion	20
Menière-Krankheit mit seltenen Anfällen (1 - 2 mal im Jahr)	0
Menière-Krankheit mit häufigeren Anfällen	20 - 40
Menière-Krankheit mit schweren monatlichen Anfällen	50
Einseitige Radikaloperationshöhle	10
Beidseitige Radikaloperationshöhle	20
Verlust einer Ohrmuschel	20
Verlust beider Ohrmuschel	30
Totalverlust der Nase	50
Teilverlust der Nase	30

Verengung der Nasengänge - je nach Beeinträchtigung des Atmens	0 - 30
Leichte Nebenhöhlenentzündung (chronisch)	0 - 10
Schwere Nebenhöhlenentzündung (chronisch)	20 - 40
Totalverlust des Riechvermögens	15
Totalverlust des Geschmacksinns	10
Stinknase (ozeana) - je nach Borkenbildung	20 - 40

## Herz und Kreislaufsystem

<a href="#">Herz</a>	
Erkrankung	GdB Wert
Herzklappenfehler, Kardiomyopathie oder koronare Krankheiten ohne Leistungsbeeinträchtigung	0 - 10
Herzklappenfehler, Kardiomyopathie oder koronare Krankheiten mit Leistungsbeeinträchtigung bei mittlerer Belastung	20 - 40
Herzklappenfehler, Kardiomyopathie oder koronare Krankheiten mit Leistungsbeeinträchtigung bei leichter Belastung im Alltag	50 - 70
Herzklappenfehler, Kardiomyopathie oder koronare Krankheiten mit zeitweise starken Dekompensationserscheinungen	80
Herzklappenfehler, Kardiomyopathie oder koronare Krankheiten mit Leistungsbeeinträchtigung im Ruhezustand	100
Herzrhythmusstörungen ohne Leistungsbeeinträchtigung des Herzens	Okt 30
Herzrhythmusstörungen nach Implantation eines Herzschrittmachers	10
Herzrhythmusstörungen nach Implantation eines Kardioverter-Defibrillators	mind. 50

Bei dem Einsatz einer Herzklappenprothese ist der GdB mit mindestens 30 anzusetzen.

Die Dauerbehandlung mit Antikoagulantien ist in dieser Bewertung mit einbezogen. Nach einer Herztransplantation sollte der Wert nicht unter 70 sein.

<a href="#">Kreislaufsystem</a>	
Erkrankung	GdB Wert
Arterienverschluß mit genügend Restdurchblutung	0 - 10
Arterienverschluß mit eingeschränkter Restdurchblutung (Einseitig / Beidseitig) - Schmerzfreie Gehstrecke 500 m	20
Arterienverschluß mit eingeschränkter Restdurchblutung (Einseitig / Beidseitig) - Schmerzfreie Gehstrecke 100 - 500 m	30 - 40

Arterienverschluß mit eingeschränkter Restdurchblutung (Einseitig / Beidseitig) - Schmerzfreie Gehstrecke 50 - 100 m	50 - 60
Arterienverschluß mit eingeschränkter Restdurchblutung (Einseitig / Beidseitig) - Schmerzfreie Gehstrecke unter 50 m	70 - 80
Aneurysmen ohne Belastungsstörungen oder Funktionsstörung	0 - 10
Aneurysmen mit kleinen Belastungsstörungen oder Funktionsstörung	20 - 40
Große Aneurysma	mind. 50
Einseitige oder beidseitige Krampfadern mit geringem Ödem (Abhängig von der Belastung)	0 - 10
Einseitige oder beidseitige Krampfadern mit starkem entzündetem Ödem	20 - 30
Einseitige oder beidseitige Krampfadern mit chronischen Geschwüren	30 - 50
Lymphödem ohne Behinderung von Funktionen	0 - 10
Lymphödem mit größerer Umfangsvermehrung	20 - 40
Lymphödem mit starker Beeinträchtigung der betroffenen Gliedmaße	50 - 70
Lymphödem bei Unbrauchbarkeit der betroffenen Gliedmaße	80
Geringer Bluthochdruck (Hypertonie) ohne Auswirkungen auf die körperliche Leistung	0 - 10
Mittlerer Bluthochdruck (Hypertonie) mit Auswirkungen auf Organe	20 - 40
Starker Bluthochdruck (Hypertonie) mit Beteiligung mehrerer Organe	50 - 100
Maligner Bluthochdruck mit einem konstanten diastolischen Blutdruck von über 130 mmHG und starken körperlichen Auswirkungen	100
Funktionelle kardiovaskuläre Syndrome mit leichten Beschwerden	0
Funktionelle kardiovaskuläre Syndrome mit starken Beschwerden und Neigung zum Kollaps	20

## Innere Sekretion und Stoffwechsel

<a href="#">Diabetes</a>	
<b>Erkrankung</b>	<b>GdB Wert</b>
Gut einstellbare Diabetes mellitus Typ 1	40
Schwer einstellbare Diabetes mellitus Typ 1	50
Ausreichend einstellbare Diabetes mellitus Typ 2 (ohne blutzuckerregulierende Medikamente)	Okt 30

<a href="#">Innere Sekretion und Stoffwechsel</a>	
Erkrankung	GdB Wert
Fettstoffwechselkrankheiten mit notwendiger LDL-Apherese (z.B. Adipositas oder Alimentäre Fettsucht)	30
Phenylketonurie ohne sichtbare Folgeerscheinungen bei Kindern bis 16. Jahre	30
Phenylketonurie ohne sichtbare Folgeerscheinungen für Personen ab dem 17. Lebensjahr. (Diäteeinnahme muss erforderlich sein)	10
Mukoviszidose (zystische Fibrose) in Therapie - Entwicklung und Ernährung altersgemäß	20
Mukoviszidose (zystische Fibrose) in Therapie - Entwicklung und Ernährung altersgemäß - Lungenfunktion leicht eingeschränkt	30 - 40
Mukoviszidose (zystische Fibrose) in Therapie - Entwicklung verzögert - Lungenfunktion stark eingeschränkt	50 - 70
Mukoviszidose (zystische Fibrose) in Therapie - Schlechter Ernährungszustand - Lungenfunktion sehr stark eingeschränkt	80 - 100
Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines follikulären oder papillären Schilddrüsentumors (kein Befall der Lymphknoten)	50
Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines sonstigen Schilddrüsentumors	80
Erythropoetische Porphyrie (Günther-Krankheit)	100
Hepatische Porphyrie ohne Beschwerden	10
Akut intermittierende Hepatische Porphyrie	30

## Verdauungsorgane

<a href="#">Erkrankungen der Speiseröhre</a>	
Erkrankung	GdB Wert
Traktionsdivertikel - je nach Beschwerden und Größe	0 - 10
Pulsionsdivertikel ohne Beeinträchtigung auf die Nahrungsaufnahme	0 - 10
Pulsionsdivertikel mit starker Beeinträchtigung auf die Nahrungsaufnahme	20 - 40
Funktionelle Stenose (Verengung) der Speiseröhre (Achalasie, Ösophagospasmus) ohne Beeinträchtigung auf die Nahrungsaufnahme	0 - 10

Funktionelle Stenose (Verengung) der Speiseröhre (Achalasie, Ösophagospasmus) mit Beeinträchtigung auf die Nahrungsaufnahme	20 - 40
Funktionelle Stenose (Verengung) der Speiseröhre (Achalasie, Ösophagospasmus) mit starker Beeinträchtigung auf die Nahrungsaufnahme	50 - 70
Organische Stenose der Speiseröhre (z.B. Lungenverätzung oder Narbenstenose) ohne Beeinträchtigung auf die Nahrungsaufnahme	0 - 10
Organische Stenose der Speiseröhre (z.B. Lungenverätzung oder Narbenstenose) mit Beeinträchtigung auf die Nahrungsaufnahme	20 - 40
Organische Stenose der Speiseröhre (z.B. Lungenverätzung oder Narbenstenose) mit starker Beeinträchtigung auf die Nahrungsaufnahme	50 - 70
Refluxkrankheit der Speiseröhre mit dauerhaften Refluxproblemen	30
Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines Speiseröhrenzustandes (Je nach Zustand der Ernährung)	80 - 100
Ersatz der Speiseröhre - je nach Auswirkung	mind. 20

<u>Erkrankungen des Magen- Darm Traktes</u>	
<b>Erkrankung</b>	<b>GdB Wert</b>
Chronische rezidivierende Geschwüre im Magen oder Zwölffingerdarm mit Beschwerden im Abstand von 2 bis 3 Jahren	0 - 10
Chronische rezidivierende Geschwüre im Magen oder Zwölffingerdarm mit Beeinträchtigung des Ernährungszustandes	20 - 30
Chronische rezidivierende Geschwüre im Magen oder Zwölffingerdarm mit starken Beschwerden und Problemen mit dem Ernährungszustand	40 - 50
Chronische Gastritis	0 - 10
Reizmagen (Dyspepsie)	0 - 10
Entfernung eines Teils des Magens (Gastroenterostomie) mit guter Funktion des Restmagens	0 - 10
Entfernung eines Teils des Magens (Gastroenterostomie) mit bleibenden Beschwerden des Restmagens (z.B. Dumping-Syndrom)	20 - 40
Komplette Entfernung des Magens ohne Auswirkungen auf den Ernährungszustand	20 - 30
Komplette Entfernung des Magens mit Auswirkungen auf den Ernährungszustand	40 - 50
Heilungsbewährung von 2 Jahren nach Entfernung eines Magenfrühkarzinoms	50

Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines Magentumors - je nach Stadium	80 - 100
Chronische Darmstörungen (z.B. Darmteilresektion, Divertikulitis, Divertikulose) ohne Auswirkungen	0 - 10
Chronische Darmstörungen (z.B. Darmteilresektion, Divertikulitis, Divertikulose) mit andauernden Auswirkungen	20 - 30
Chronische Darmstörungen (z.B. Darmteilresektion, Divertikulitis, Divertikulose) mit starken Auswirkungen auf den Ernährungszustand	40 - 50
Motilitätsstörungen des Darmes - Angeboren (z.B. neuronale Dysplasie) ohne Entwicklungsstörungen	20
Motilitätsstörungen des Darmes - Angeboren (z.B. neuronale Dysplasie) mit leichten Entwicklungsstörungen	30 - 40
Motilitätsstörungen des Darmes - Angeboren (z.B. neuronale Dysplasie) mit mittleren Entwicklungsstörungen	50
Motilitätsstörungen des Darmes - Angeboren (z.B. neuronale Dysplasie) mit starken Entwicklungsstörungen	60 - 70
Kurzdarmsyndrom im Kindesalter mit mittleren Entwicklungsstörungen	50 - 60
Kurzdarmsyndrom im Kindesalter mit starken Entwicklungsstörungen	70 - 100
Colitis ulcerosa mit schwachen Auswirkungen auf den Ernährungszustand (z.B. seltene Durchfälle)	Okt 20
Colitis ulcerosa mit mittleren Auswirkungen auf den Ernährungszustand (z.B. häufige Durchfälle)	30 - 40
Colitis ulcerosa mit starken Auswirkungen auf den Ernährungszustand (z.B. tägliche Durchfälle)	50 - 60
Colitis ulcerosa mit sehr starken Auswirkungen auf den Ernährungszustand (z.B. ausgeprägte Anämie)	70 - 80
Leichte Zöliakie	20
Heilungsbewährung von 2 Jahren nach Entfernung eines Darmtumors (Frühstadium)	50
Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines Darmtumors (Frühstadium) mit dauerhaftem künstlichem After	70 - 80
Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines sonstigen Darmtumors	mind. 80
Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines sonstigen Darmtumors mit dauerhaftem künstlichem After	100
Hämorrhoiden mit geringer Neigung zu Blutungen	0 - 10
Hämorrhoiden mit häufigen Entzündungen oder Blutungen	20
Geringer Mastdarmvorfall	0 - 10

Sonstiger Mastdarmvorfall	20 - 40
Afterschließmuskelschwäche mit seltenen Stuhlabgängen	10
Afterschließmuskelschwäche mit häufigeren Stuhlabgängen	20 - 40
Afterschließmuskel ohne Funktion	mind. 50
Kleine Fistel in Umgebung des Afters	10
Sonstige Fistel in Umgebung des Afters	20 - 30
Künstlicher After mit guter Versorgungsmöglichkeit	50
Sonstiger künstlicher After	60 - 80

<u>Hepatitis</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Chronische Hepatitis ohne entzündliche Aktivität	20
Chronische Hepatitis mit geringer entzündliche Aktivität	30
Chronische Hepatitis mit mittlerer entzündliche Aktivität	40
Chronische Hepatitis mit starker entzündliche Aktivität - je nach Auswirkung	50 - 70

<u>Leberschäden</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Leberfibrose ohne Auswirkungen	0 - 10
Inaktive Leberzirrhose	30
Wenig aktive Leberzirrhose	40
Sehr aktive Leberzirrhose	50
Hepatische Enzephalopathie	60 - 100
Fettleber ohne Mesenchymreaktion	10
Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines Lebertumors	100
Heilungsbewährung von 2 Jahren nach Lebertransplantation	100

<u>Gallenwegskrankheiten / Gallenblasenkrankheiten</u>	
Erkrankung	GdB Wert
Gallenwegskrankheiten / Gallenblasenkrankheiten (z.B. Verlust der Gallenblase oder Gallensteine) mit seltenen Koliken und Entzündungen	0 - 10
Gallenwegskrankheiten / Gallenblasenkrankheiten (z.B. Verlust der Gallenblase oder Gallensteine) mit regelmäßigen Koliken und Entzündungen	20 - 30
Gallenwegskrankheiten / Gallenblasenkrankheiten (z.B. Verlust der Gallenblase oder Gallensteine) mit lang anhaltenden Koliken und Entzündungen	40 - 50

Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines Gallenwegstumors oder Gallenblasentumors	100
Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines Papillentumors	80
Chronische Erkrankung der Bauchspeicheldrüse ohne Beschwerden	0 - 10
Chronische Erkrankung der Bauchspeicheldrüse mit geringen bis mittleren Beschwerden	20 - 40
Chronische Erkrankung der Bauchspeicheldrüse mit starken Beschwerden	50 - 80
Heilungsbewährung von 5 Jahren nach Entfernung eines Bauchspeicheldrüsentumors	100

## Brüche (Hernien)

Brüche (Hernien)	
Erkrankung	GdB Wert
Einseitiger oder beidseitiger Leistenbruch / Schenkelbruch	0 - 10
Einseitiger oder beidseitiger Leistenbruch / Schenkelbruch mit starken Einschränkungen der Mobilität oder Belastbarkeit	20
Nabelbruch	0 - 10
Angeborene Bauchwanddefekte ohne Auswirkungen	0 - 10
Ausgedehnte angeborene Bauchwanddefekte mit fehlender Bauchpresse	20
Angeborene Bauchwanddefekte mit Auswirkungen auf die Bauchorgane	20 - 30
Angeborene Bauchwanddefekte mit häufigen rezidivierenden Ileuserscheinungen	40 - 50
Speiseröhrengleithernie	0 - 10
Kleiner Zwerchfellbruch ohne Auswirkungen	0 - 10
Großer Zwerchfellbruch - je nach Auswirkungen	20 - 30
Angeborene Zwerchfelldefekte mit leichten Auswirkungen auf die Lungenfunktion	40
Angeborene Zwerchfelldefekte je nach Auswirkungen auf die Organe	50 - 100